

Tandfjernelse ved knoglestyrkende medicin

Om indgrebet

Patienter i behandling med knoglestyrkende medicin (bisfosfonater eller denosumab) har en øget risiko for dårlig heling af kæbeknoglen (MRONJ). Risikoen er størst ved intravenøs behandling og ved langvarig brug. Det er afgørende, at vi kender din medicinstatus, inden vi foretager indgrebet.

Indgrebet udføres typisk i lokalbedøvelse.

Før behandlingen

- Fortæl os præcist hvilken medicin du tager, dosis og behandlingsvarighed.
- Informér os om allergi over for bedøvelsesmidler, penicillin eller anden medicin.
- Alle tandproblemer bør om muligt behandles konservativt – rodbehandling foretrækkes frem for ekstraktion.

Efter behandlingen

- Tag det ordinerede antibiotika som foreskrevet.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. 1 minut, 2 gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Kold, flydende kost i 24 timer og herefter blød mad i 5 dage.
- Tag smertestillende medicin som anbefalet.
- Undgå rygning og alkohol i hele helingsfasen – det øger risikoen for komplikationer markant.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 2–3 uger. Hvis de generer, kan du få dem fjernet efter 7–10 dage.
- Opfølgningskontrol efter 4 uger hos os.

Heling og forventninger

Smerte og hævelse toppe på 3–4 dagen og aftager herefter gradvist. Helingsfasen kan være længere end ved sædvanlig tandfjernelse – vær tålmodig og kontakt os ved komplikationer. Vi kontrollerer operationsstedet efter 4 uger.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; vedvarende blødning kontaktes vi.
- Infektion – feber, øget smerte og dårlig smag kan være tegn på infektion.
- MRONJ (knogleødelæggelse) – eksponeret knogle i munden, der ikke heler.
- Nervepåvirkning – midlertidig eller sjælden permanent følelsesløshed i læbe, kind eller tunge.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: xx xx xx xx

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk (indsæt e-mail)

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen.