



Rodspidsamputation

Om indgrebet

En rodspidsamputation (apikoektomi) udføres, når en rodbehandlet tand fortsat er inficeret, og infektionen ikke kan behandles tilstrækkeligt via tandkronen. Under indgrebet fjernes rodspidsen og det inficerede væv, og rodkanalen lukkes fra spidsen. Indgrebet kan redde tanden.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 45–90 minutter afhængigt af tandens placering og anatomi.

Før behandlingen

- Spis et let måltid 2–3 timer før indgrebet.
- Fortæl os om al medicin du tager, herunder blodfortyndende medicin.
- Informér os om allergier

Efter behandlingen

- Undgå at spytte, suge, skylle kraftigt eller røre ved såret de første 24 timer.
- Spis kold og blød kost i de første 24 timer. Herefter blød mad i 5 dage.
- Undgå rygning i mindst 5 dage – det hæmmer heling og øger infektionsrisikoen.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. 1 minut, 2 gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Tag smertestillende medicin som anbefalet. 1000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen x 4 dagligt i 4 dage. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 2–3 uger. Hvis de generer, kan du få dem fjernet efter 7–10 dage.

Heling og forventninger

Smerte og hævelse toppe på 3–4 dagen og aftager herefter gradvist. En kold kompres (ikke is direkte på huden) de første 24 timer kan reducere hævelsen. Fuld heling af bløddele sker typisk efter 2–3 uger. Knoglen regenererer over 3–12 måneder, og vi kontrollerer med røntgen efter 6–12 måneder.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; vedvarende blødning kontaktes os.
- Infektion – feber, øget smerte og dårlig smag kan være tegn på infektion.
- Nervepåvirkning – midlertidig følelsesnedsættelse i det opererede område.
- Kommunikation til bihule – mulig ved operationer i overkæben.

- Manglende heling – I nogle tilfælde kan tanden alligevel ikke reddes og vi fjerner tanden.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: xx xx xx xx

E-mail: nej@specialkliniksilkeborg.dk (indsæt e-mail)

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen.