



Implantatindsættelse

Om indgrebet

Et tandimplantat er en titaniumskrue, der indsættes i kæbeknoglen og fungerer som en kunstig tandrod. Ovenpå implantatet monteres efterfølgende en krone, bro eller proteseforankring. God mundhygiejne og tilstrækkelig knogle er forudsætninger for et vellykket resultat.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 30–90 minutter afhængigt af antallet af implantater og kæbens anatomi.

Før behandlingen

- Spis et let måltid 2–3 timer før indgrebet.
- Fortæl os om al medicin du tager, herunder blodfortyndende medicin og bisfosfonater.
- Informér os om allergier.

Efter behandlingen

- Undgå at spytte, suge, skylle kraftigt eller røre ved operationsstedet de første 24 timer.
- Spis kold og blød kost i de første 24 timer. Herefter blød mad i 5 dage.
- Undgå rygning i mindst 8 uger – rygning øger risikoen for implantatsvigt markant.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. 1 minut, 2 gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Begynd at børste forsigtigt omkring helingsskruen efter 7 dage.
- Tag smertestillende medicin som anbefalet. 1000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen x 4 dagligt i 4 dage. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Undgå sportsaktivitet de første 3–5 dage.
- Selfopløselige sting forsvinder typisk efter 4-5 uger. Vi fjernes dem dog til kontrol efter 2 uger.

Heling og forventninger

Smerte og hævelse toppe på 3–4 dagen og aftager herefter gradvist. Titaniumimplantatet vokser fast til knoglen (osseointegration) over 6–12 uger i underkæben og 12–16 uger i overkæben, inden kronen kan monteres.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; vedvarende blødning kontaktes vi.
- Infektion – feber, øget smerte og dårlig smag kan være tegn på infektion.
- Implantatsvigt – manglende osseointegration, særlig risiko ved rygning og diabetes.

- Nervepåvirkning – midlertidig eller sjælden permanent følelsesløshed i læbe, kind eller tunge.
- Kommunikation til bihule – sjælden komplikation ved overkæbeimplantater.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: xx xx xx xx

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen.